

★アレルギー検査（IgE抗体）をおこなうときの注意点

- ・セット検査は精度が落ちるため、下記のひとつずつの項目（シングルアレルゲン）を調べる必要があります。
- ・成人の場合はある程度は正確ですがそれでも絶対に正しいわけではありません（偽陰性・偽陽性、共にあります）。
- ・下記の赤色は当院で頻度の高いアレルゲンです。
- ・下記の黄色は結果がでるまでに5日程度かかります。それ以外は2～3日でできます。

食物アレルゲン		
卵・乳製品	野菜	穀類
卵黄	アボカド	ソバ
卵白	セロリ	小麦
オボムコイド	トマト	グルテン
牛乳	ニンジン	ω-5 グリアジン
α-ラクトアルブミン	ヤマイモ	大麦
β-ラクトグロブリン	レタス	オート麦
カゼイン	インゲン	ライ麦
CHEDARチーズ	カボチャ	麦芽
肉	サツマイモ	米
牛肉	ジャガイモ	トウモロコシ
鶏肉	タケノコ	ゴマ
豚肉	タマネギ	豆類・ナッツ
羊肉	ニンニク	大豆
魚	パセリ	Gly m 4(大豆由来)
サバ	ホウレンソウ	ピーナッツ
アジ	果物	Arah2(ピーナッツ由来)
イワシ	イチゴ	ペカンナッツ
カレイ	オレンジ	ブラジルナッツ
サケ	キウイ	ハシバミの実(ヘーゼルナッツ)
タラ	ココナッツ	カシューナッツ
マグロ	スイカ	エンドウ
イカ	バナナ	カカオ
タコ	マンゴー	アーモンド
イクラ	メロン	クルミ
タラコ	モモ	その他
貝・甲殻類	洋ナシ	ビール酵母
カニ	リンゴ	マスタード
エビ	グレープフルーツ	ゼラチン
ロブスター		
アサリ	寄生虫アレルゲン	その他アレルゲン
ホタテ	アニサキス	ラテックス
カキ(貝)	回虫	綿
ムラサキイガイ	包虫	

吸入性アレルゲン（花粉）		
ヒノキ科植物	カバノキ科植物	キク科植物
ヒノキ	ハンノキ（属）	ブタクサ
スギ	シラカンバ（属）	オオブタクサ
イネ科植物	ハシバミ（属）	ニセブタクサ
カモガヤ	樹木	ブタクサモドキ
オオアワガエリ	カエデ（属）	ヨモギ
ハルガヤ	ブナ（属）	ニガヨモギ
ギョウギシバ	ビャクシン（属）	フランスギク
ヒロハウシノケグサ	コナラ（属）	タンポポ（属）
ホソムギ	ニレ（属）	雑草
アシ	オリーブ	ヘラオオバコ
ナガハグサ	クルミ（属）	シロザ
コヌカグサ（属）	ヤナギ（属）	アキノキリンソウ
セイパンモロコシ	マツ（属）	アオゲイトウ
シラゲガヤ	アカシア（属）	ヒメスイバ
小麦（属）（花粉）	ホソイトスギ	イラクサ
オオスズメノテッポウ	クワ（属）	カナムグラ

吸入性アレルゲン（花粉以外）		
ペット	真菌・細菌	室内塵
イヌ皮膚	アスペルギルス	ハウスダスト1
ネコ上皮・皮膚	アルテルナリア	ハウスダスト2
家兎上皮	ペニシリウム	ハウスダスト6
ハムスター上皮	クラドスポリウム	ダニ
セキセイインコ羽毛	エピコッカム	ヤケヒョウヒダニ
セキセイインコのフン	オーレオバシジウム	コナヒョウヒダニ
実験動物・家畜・他	カーブラリア	アシブトコナダニ
マウス	カンジダ	ケナガコナダニ
マウス上皮	ステムフィリウム	サヤアシニクダニ
モルモット上皮	フォーマ	イエニクダニ
ラット	フザリウム	昆虫アレルゲン
ラット上皮	ヘルミントンスポリウム	ガ
ラット血清蛋白	マラセチア	ゴキブリ
ウシ皮膚	ムコール	ユスリカ（属）
ウマ皮膚	リゾプス	ヤブカ（属）
羊上皮	トリコフィトン	アシナガバチ
豚上皮	黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンA	スズメバチ
ヤギ上皮	黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンB	スズメバチ（ホワイトフェイス）
アヒル羽毛	ピティロスポリウム	スズメバチ（イエローフェイス）
ガチョウ羽毛		
ニワトリ羽毛		